

KLINICKÝ PROTOKOL **indikácií testovania metódou PCR na dôkaz SARS-CoV-2 (verzia 10)**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva nasledovné úpravy k indikáciám pre odber vzoriek výterov z orofaryngu a nazofaryngu za účelom PCR diagnostiky suspektných alebo pozitívnych osôb v súvislosti s COVID-19:

Odbery vzoriek na vyšetrenie PCR metódou pre stanovenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 sa má realizovať u dospelých z orofaryngu aj nazofaryngu. U detí do 7 rokov je možné použiť iba orofaryngeálny ster.

Pacienti indikovaní na vyšetrenie na základe klinických príznakov

- Pacient (dospelý alebo dieťa) s akútnou infekciou dýchacích ciest - náhly nástup aspoň jedného z nasledujúcich symptómov: kašeľ, dýchavičnosť, telesná teplota nad 38 °C po dobu 3 a viac dní bez inej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz, resp. ak nie je známa epidemiologická anamnéza napr. anamnéza cestovania alebo pobytu v krajine/oblasti s lokálnym prenosom alebo prenosom v komunite, počas 14 dní pred objavením sa symptómov.
- Pacient (dospelý alebo dieťa) s miernymi príznakmi respiračného ochorenia (bolesti hrdla, ucha, upchatý nos) po zvážení epidemiologického rizika ošetrojúcim lekárom
- Pacient s náhle vzniknutou poruchou čuchu alebo chuti
- Pacient s akútnym respiračným ochorením, ktorý bol v posledných 14 dňoch pred objavením sa symptómov v úzkom kontakte s potvrdeným COVID-19.
- Klienti v zariadeniach sociálnych služieb alebo z MRK (marginalizovaných rómskych komunít) s respiračnou infekciou (na indikáciu všeobecného lekára, infektológa, epidemiológa, alebo hygienika).
- Tehotné pacientky, ktoré prišli na pôrod akútne a majú respiračnú infekciu alebo kontakt s potvrdeným (v posledných 14 dňoch) alebo s pravdepodobným prípadom COVID-19 (v procese vyšetrenia PCR).
- Pacienti pred akútnym operačným/ intervenčným výkonom v celkovej anestézii s respiračnou infekciou a/alebo známym úzkym kontaktom alebo z karantény pre COVID-19.
- Pacienti na OAIM a JIS pri náhlom vývoji respiračnej insuficiencie s nejasnou etiológiou.
- Pacient vyžadujúci hospitalizáciu so SARI (ťažká akútna respiračná infekcia) a bez ďalšej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz.

Pacienti indikovaní na vyšetrenie na základe epidemiologických a iných kritérií

- Úzke kontakty s osobou s potvrdenou infekciou COVID-19 (odobrať výter sa odporúča na 5. až 10. deň od posledného kontaktu).
- Je možné zvážiť vyšetrenie exponovaných zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov pracujúcich v karanténnych centrách (napr. MVSR pri repatriácii, s ľuďmi bez domova), MO SR, OZ SR pri práci s rizikovými skupinami (pre túto skupinu je možné v rámci skríningu stanoviť protilátky proti SARS-CoV-2 (imunoanalýza, RDT test a pri náleze protilátok proti SARS-CoV-2 následne vykonať RT PCR SARS-CoV-2).
- Psychiatrickí pacienti, u ktorých nie je možné odobrať spoľahlivú objektívnu anamnézu alebo s nízkou úrovňou dodržiavania epidemiologických štandardov.
- Klienti a zamestnanci v ZSS (zariadeniach sociálnych služieb) a CDR (centrá pre deti a rodinu), v denných stacionároch alebo z MRK pri reaktívnom RDT na COVID-19.
- Traumatické stavy so zmenou vedomia a neurčité stavy na základe rozhodnutia lekára.
- Test pred odberom orgánu od darcu za účelom transplantácie.
- Pacienti pri prijíme do nemocnice alebo počas hospitalizácie, ktorí majú alebo počas hospitalizácie vyvinú respiračnú infekciu, nejasné febrility alebo z epidemiologických dôvodov z rozhodnutia lekára, RÚVZ alebo nemocničného epidemiológa (vyšetrenie metódou PCR).
- Pred plánovaným operačným zákrokom pri prijatí na hospitalizáciu na základe indikácie operátora (alebo nemocničného epidemiológa) pri nepriaznivej lokálnej epidemiologickej situácii (v súlade s Pandemickým plánom) alebo v prípade, že to odôvodňuje stav pacienta alebo charakter operačného zákroku.

Schválené Konziliom epidemiológov, verejných zdravotníkov a infektológov ÚV SR a MZ SR, NRC pre chrípku, ministrom zdravotníctva MUDr. Marekom Krajčím a Hlavným hygienikom SR MUDr. RNDr. Mgr. Jánom Mikasom, PhD, MPH
Platné od dňa: 14.9.2020